

Розриви рогівки у дрібних тварин

By [Sara M. Thomasy](#), DVM, PhD, DACVO, Department of Surgical and Radiological Sciences, School of Veterinary Medicine, University of California-Davis

Медичний огляд Mar 2020 | Змінено Nov 2022

Розриви рогівки можуть бути наслідком тих самих причин, що й проникаючі сторонні тіла, за винятком того, що предмет не залишається в рані. Наприклад, поранення котячими кігтями та металевими предметами є поширеними причинами повношарових розривів у дрібних тварин і коней відповідно. Клінічні ознаки та діагностичне обстеження подібні до таких при [проникаючому внутрішньоочному пораненні](#). Особливо важливо оцінити наявність одночасного ураження кришталика. Прогноз залежить від розміру та положення розриву рогівки, а також від залучення райдужної оболонки, кришталика та/або склери з одночасним пролапсом райдужної оболонки, при чому пошкодження кришталика та/або залучення склери мають тенденцію до більш поганого прогнозу.

У зрячих пацієнтів розрив рогівки зашивають простими вузловими швами розсмоктувальним матеріалом від 7-0 до 9-0. Для додаткової стабільності може бути накладена лінія безперервного шву. Щоб забезпечити додатковий захист і підтримку, зашитий розрив можна прикрити клаптем бульбарної кон'юнктиви та/або за допомогою часткової тимчасової тарзорафії. Якщо пацієнт сліпий, слід розглянути питання щодо енуклеації, хоча деякі власники можуть обрати хірургічне втручання в косметичних цілях.

Післяопераційна терапія для контролю вторинного іридоцикліту складається з місцевих та системних антибіотиків, системних НПЗП і мідріатиків.

Післяопераційна терапія подібна до такої при [проникаючих внутрішньоочних сторонніх тілах](#) і включає місцеві та системні антибіотики для запобігання інфекційному кератиту або ендoftальміту відповідно, а також системні протизапальні засоби та місцеві мідріатики для лікування рефлекторного переднього увеїту.

До післяопераційних ускладнень належать:

- варіабельне та часто щільне рубцювання рогівки
- утворення катаракти із задніми синехіями

Розрив рогівки з пролапсом райдужки, кінь



ЛЮБ'ЯЗНО НАДАНО ЛІКАРЕМ К.
ГЕЛАТТОМ.

Розрив рогівки з відшаруванням сітківки, собака

- вторинна глаукома
- субатрофія ока
- бактеріальний кератит або ендoftальміт

Додаткова інформація

Також перегляньте матеріал про здоров'я свійських тварин щодо пошкоджень рогівки у тварин.



ЛЮБ'ЯЗНО НАДАНО ЛІКАРЕМ К.
ГЕЛАТТОМ.

Повношаровий розрив рогівки, кішка



НАДАНО СЛУЖБОЮ ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
КАЛІФОРНІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
В ДЕВІСІ.

Повношаровий розрив рогівки після первинного хірургічного закриття, кішка



НАДАНО СЛУЖБОЮ ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
КАЛІФОРНІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
В ДЕВІСІ.



Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.